

02. Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

HydroTac Transparent ist ein transparenter Hydrogeleverband aus hydratisiertem Polyurethan. Die Rückseite besteht aus einer wasserundurchlässigen, flüssigkeits- und keimdichten Polyurethan-Folie. HydroTac Transparent Comfort verfügt zusätzlich über einen umlaufenden, selbsthaftenden Kleberand, der mit einem auf Acrylat basierten Kleber beschichtet ist.

Eigenschaften und Wirkungsweise

HydroTac Transparent kann sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch in begrenztem Maße Flüssigkeit aufnehmen. Hierdurch stellt sich ein feuchtes Wundmilieu ein, das stimulierend auf die Wundheilung wirkt. HydroTac Transparent ist transparent und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Durch die Transparenz ist eine Wundinspektion jederzeit und ohne Verbandwechsel möglich.

Da HydroTac Transparent Comfort über einen haftfreundlichen umlaufenden Kleberand verfügt, sind keine zusätzlichen Materialien zur Verbandfixierung notwendig.

Zweckbestimmung/Indikationen

HydroTac Transparent eignet sich für die Behandlung von trockenen Wunden oder Wunden mit geringer Exsudatmenge in der Granulations- und Epithelisierungsphase.

HydroTac Transparent sollte von medizinischen Fachkräften verwendet werden. Diese können den Verbandwechsel an die Patienten und/oder ihre Angehörigen (Laien unter Anweisung von Fachkräften) delegieren.

Anwendungsanweisung

HydroTac Transparent in der Größe so auswählen, dass das Wundkissen die Wundränder ca. 1 – 2 cm überlappt. Falls erforderlich, kann HydroTac Transparent auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden; dafür darf nur eine sterile Schere verwendet werden. Die umliegende Haut sollte trocken sein, bevor HydroTac Transparent Comfort mit umlaufendem Kleberand angebracht wird.

HydroTac Transparent: Die blaue Schutzfolie entsprechend der Nummerierung (1 & 2) abziehen. Den Verband mit der gegeschichteten Seite auf die Wunde legen und mit einem geeigneten Sekundärverband fixieren.

HydroTac Transparent Comfort: Die blaue Schutzfolie entsprechend der Nummerierung (1 & 2) abziehen. Den Verband mit der gegeschichteten Seite auf die Wunde legen und den Kleberand gut andrücken. Dann die schützende Deckfolie entsprechend der Nummerierung (3 & 4) abziehen.

HydroTac Transparent kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. HydroTac Transparent zum Verbandwechsel an einer Ecke leicht lösen und vorsichtig abheben.

Produktentstörung

Als das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten von HydroTac Transparent gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Kontraindikationen

HydroTac Transparent nicht bei Patienten mit einer Unverträglichkeit gegen einen der Bestandteile, insbesondere Polyurethan, Glycerin oder eines auf Acrylat basierten Klebers, anwenden. Nicht anwenden, wenn eine klinische Infektion vorliegt, desgleichen bei Brandwunden 3. Grades.

Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes andere Medizinprodukt kann die Wundauflage Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem Patienten auftreten. Allgemeine Nebenwirkungen von HydroTac Transparent:

- In seltenen Fällen kann HydroTac Transparent eine allergische Reaktion hervorrufen (Reizung, Hautirritationen wie z. B. Rötung, Schwellung).
- In seltenen Fällen kann HydroTac Transparent eine allergische Reaktion hervorrufen Wenn Nebenwirkungen bei Patienten auftreten, auch welche die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Besondere Vorichtmaßnahmen

Vor jeder Behandlung muss mit beachtlicherer Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen aller Wundheilungsstörungen notwendig. Die Behandlung mit HydroTac Transparent kann eine Kasualbehandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen. Die Wiederanfertigung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

Vor dem Öffnen der Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tümel, Einstüchlicher oder ungleichmäßige, abgeblöste, gerissene oder unvollständige Siegelung.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Verwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte): wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinen Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Allgemeine Hinweise

Bei längerer Lagerung kann eine leichte Gelbfärbung auftreten, welche keinerlei Auswirkungen auf die Produkt Eigenschaften hat. Für Kinder ungeeignete Aufbewahrung.

*Wenn HydroTac Transparent im folgenden Text genannt wird, bezieht sich dies auf alle Aufmachungen, einschließlich der Comfort-Varianten; davon abweichend ausgenommen sind ausdrücklich erwähnt.

Stand der Information: 2024-04-07

DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2335 Wiener Neudorf
UK – HV HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

03. Instructions for use

Product description

HydroTac Transparent™ is a transparent hydrogel dressing consisting of hydrated polyurethane. The backing consists of a water vapour permeable polyurethane film which is impermeable to liquids and bacteria.

In addition, HydroTac Transparent Comfort has an adhesive border, which is coated with an acrylic based adhesive.

Properties and mode of action

HydroTac Transparent can release moisture and absorb a limited amount of exudate. This provides a moist wound environment which has a stimulating effect on wound healing. HydroTac Transparent is transparent and enables atraumatic dressing change. Because of the transparency, wound inspection is possible at any time without having to remove the dressing.

As HydroTac Transparent Comfort has a skin-friendly adhesive film border, no other materials are needed to secure the dressing.

Indications

HydroTac Transparent is suitable for the treatment of dry or lightly exuding wounds in the granulation and epithelialization stages.

HydroTac Transparent is intended to be applied by healthcare professionals. The product may delegate dressing changes to patients and/or their relatives (non-professionals under guidance of professionals).

Mode of application

Select a size of HydroTac Transparent to suit the wound pad overlaps the margins of the wound by approx. 1 – 2 cm. If required, the product HydroTac Transparent may be cut to desired shape using sterile scissors only. Surrounding skin should be dry before applying HydroTac Transparent Comfort with adhesive border.

HydroTac Transparent: Remove the blue protective layer following the numbering (1 & 2), place the dressing with the gel-impregnated side on the wound and press down the adhesive edges firmly. Remove the protective top layer following the numbering (3 & 4).

HydroTac Transparent can be left on wounds up to seven days. To change the dressing, detach HydroTac Transparent slightly at one edge and remove it carefully.

Product disposal

To minimize the risk of potential infection hazards or environmental pollution, disposable components of HydroTac Transparent should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.

Contraindications

Do not use HydroTac Transparent on patients with an intolerance to any of its ingredients, especially polyurethane, glycerin or acrylic based adhesive. Do not use on wounds which are clinically infected or on 3rd degree burns.

HydroTac Transparent: The blue Schutzfolie corresponding the Nummerierung (1 & 2) abziehen. Den Verband mit der gegeschichteten Seite auf die Wunde legen und mit einem geeigneten Sekundärverband fixieren.

HydroTac Transparent Comfort: Die blaue Schutzfolie entsprechend der Nummerierung (1 & 2) abziehen. Den Verband mit der gegeschichteten Seite auf die Wunde legen und den Kleberand gut andrücken. Dann die schützende Deckfolie entsprechend der Nummerierung (3 & 4) abziehen.

HydroTac Transparent kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. HydroTac Transparent zum Verbandwechsel an einer Ecke leicht lösen und vorsichtig abheben.

Product entrestion

Als das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten von HydroTac Transparent gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Kontraindikationen

HydroTac Transparent nicht bei Patienten mit einer Unverträglichkeit gegen einen der Bestandteile, insbesondere Polyurethan, Glycerin oder eines auf Acrylat basierten Klebers, anwenden. Nicht anwenden, wenn eine klinische Infektion vorliegt, desgleichen bei Brandwunden 3. Grades.

Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes andere Medizinprodukt kann die Wundauflage Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem Patienten auftreten. Allgemeine Nebenwirkungen von HydroTac Transparent:

- In seltenen Fällen kann HydroTac Transparent eine allergische Reaktion hervorrufen (Reizung, Hautirritationen wie z. B. Rötung, Schwellung).
- In seltenen Fällen kann HydroTac Transparent eine allergische Reaktion hervorrufen Wenn Nebenwirkungen bei Patienten auftreten, auch welche die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Besondere Vorichtmaßnahmen

Vor jeder Behandlung muss mit beachtlicherer Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen aller Wundheilungsstörungen notwendig. Die Behandlung mit HydroTac Transparent kann eine Kasualbehandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen. Die Wiederanfertigung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Verwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte): wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinen Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Allgemeine Hinweise

Bei längerer Lagerung kann eine leichte Gelbfärbung auftreten, welche keinerlei Auswirkungen auf die Produkt Eigenschaften hat. Für Kinder ungeeignete Aufbewahrung.

*Wenn HydroTac Transparent im folgenden Text genannt wird, bezieht sich dies auf alle Aufmachungen, einschließlich der Comfort-Varianten; davon abweichend ausgenommen sind ausdrücklich erwähnt.

Stand der Information: 2024-04-07

DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2335 Wiener Neudorf
UK – HV HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

04. Instrucciones de uso

Descripción del producto

HydroTac Transparent™ es un apósito transparente hidrogel que consiste en una película de poliuretano hidratado. El respaldo consiste en una película de poliuretano permeable al vapor de agua e impermeable a líquidos y bacterias.

Adicionalmente, HydroTac Transparent Comfort contiene un rebordo de fracción adhesiva, revestido de poliuretano hidratado.

Propiedades y modo de acción

HydroTac Transparent libera humedad y absorbe alguna cantidad de exudado. Deste modo, crea se un ambiente húmedo, que estimula a cicatrizar la herida. HydroTac Transparent, permite a inspección de la herida en cualquier momento de forma aséptica. Debido a la transparencia, permite a inspección de la herida en cualquier momento de forma aséptica. Debido a la transparencia, permite a inspección de la herida en cualquier momento de forma aséptica.

HydroTac Transparent puede permanecer en la herida até siete días. Para cambiar el apósito levante el HydroTac Transparent ligeramente por una esquina y retírela con cuidado.

Eliminación del producto

Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o la contaminación del medioambiente, los componentes desechables de HydroTac Transparent deben seguirse los procedimientos de eliminación conformes a la normativa local y a los estándares de prevención de infecciones.

Contraindicaciones

No use HydroTac Transparent en pacientes que tengan una intolerancia a cualquiera de sus componentes, en especial al poliuretano, al glicerol o al adhesivo de base acrílica. No utilice este dispositivo, si como consecuencia de su uso, ocurre un incidente grave, reporte o ocurrida al fabricante e/ou ao representante autorizado a sua autoridade nacional.

Modo de aplicação

Escolha o tamanho do HydroTac Transparent de forma a que este exceda os bordos da ferida em cerca de 1 a 2 centímetros. Se for necessário, HydroTac Transparent pode ser cortado para obter o tamanho desejado. Deve utilizar-se uma tesoura esterilizada. A pele circundante deve estar seca antes de aplicar HydroTac Transparent Comfort com rebordo adesivo.

Utilização prévia/Indicações

HydroTac Transparent é adequado para o tratamento de feridas secas ou com exsudado moderado, na fase de granulação e epiteliação.

Contraindicações

Não utilize HydroTac Transparent em pacientes com intolerância a qualquer um dos seus componentes, especialmente poliuretano, glicerina ou adesivo de base acrílica. Não utilize em feridas clinicamente infectadas nem em queimaduras de terceiro grau.

Possíveis efeitos adversos

Em casos raros, HydroTac Transparent pode causar reações alérgicas (irritação, reações cutâneas, inchaço).

Precauções especiais

Antes de cada tratamento de feridas de difícil cicatrização, é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrizar. O tratamento com HydroTac Transparent não substitui o tratamento das causas da dificuldade de cicatrizar.

Reutilização de dispositivos médicos de uso único e perigoso.

A reutilização de dispositivos médicos de uso único é perigosa. O reaproveitamento de dispositivos, com vista à sua reutilização, pode danificar gravemente a sua integridade e o seu desempenho.

Antes de abrir o embalagem do produto, inspecione-o cuidadosamente quanto a sinais de danos.

Posíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reacciones alérgicas (irritación y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reacciones alérgicas (irritación y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

Antes del inicio del tratamiento de heridas de difícil curación, es necesario una evaluación médica de la herida y el diagnóstico de las causas que dificultan su curación. El tratamiento con HydroTac Transparent no sustituirá un tratamiento causal de los trastornos que afectan al proceso de curación.

Reutilización de dispositivos médicos de uso único y peligroso.

La reutilización de dispositivos médicos de uso único es peligrosa. El reaproveitamiento de dispositivos, con vista a su reutilización, puede dañar gravemente su integridad y su rendimiento.

Antes de abrir el empaque del producto, inspeccione cuidadosamente el producto a ver si presenta señales de daños.

Possíveis eventos adversos

Em casos infrecuentes, HydroTac Transparent puede causar reações alérgicas (irritação y reacciones cutáneas como rojez, hinchazón, etc.).

Precauciones especiales

</

