

## DE Gebrauchsanweisung

### Produktbeschreibung

Das Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic Alginate wird aus natürlichen, aus Seetang gewonnenen, Fasern hergestellt. Als steriles Wundauflage bietet es eine schnelle und starke Saugfähigkeit. Das Alginate nimmt Wundexsudat auf und bildet eine gelartige Schicht über der Wunde. Diese Schicht schafft ein feuchtes Wundmilieu, das das Heilungsprozess beschleunigt und zur Blutstillung beiträgt. Die gelartige Oberfläche sorgt außerdem dafür, dass die Wundauflage nicht mit der Wunde verklebt und schmerzarm entfernt werden kann.

### Zusammensetzung

- Natriumalginat

### Intendete purpose and indications

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is indicated for the management of moderate to heavily exuding partial to full thickness wounds, including:

- surface trauma
- cavity wounds
- pressure ulcers
- diabetic foot ulcers
- venous/arterial leg ulcers
- donor sites
- post-operative wounds

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is intended to be used by lay persons and health care professionals.

### Anwendungshinweise

1. Choose the right size of the wound and trim the dressing to the dressing to the wound bed correctly ab.
2. Wählen Sie ausgehend vom Wundbereich die Komresse in der passenden Größe aus. Bringen Sie die Komresse auf dem Wundbett auf, ohne dabei eine Überlappung mit den anderen Kompressen. Sorbalgon Classic can remain on the wound for up to seven days. Please note that the frequency of dressing change depends on the condition of the wound and the level of exudate.
3. Bei tiefen Wunden verwenden Sie bitte Sorbalgon T Classic.
4. Bringen Sie im Anschluss ein geeigneten Sekundärverband zur Abdeckung und Fixierung der Alginate-Wundauflage an.
5. Wie häufig ein Verbandwechsel erforderlich ist, hängt vom Wundzustand und der Exsudatmenge ab.

### Entfernen:

1. Entfernen Sie vorsichtig den Sekundärverband.
2. Falls die Wunde trocken erscheint, durchlaufen Sie die Komresse vor dem Entfernen mit Kochsalzlösung.
3. Entfernen Sie die Komresse vorsichtig aus dem Wundbett und entsorgen Sie diese.

### Kontraindikationen

- Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic sollte nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.
- Das Produkt nicht auf trockenen Wunden anwenden.
- Der Verband ist nicht für die operative Implantation geeignet.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt nach Auftreten von Rötung oder Symptomen einer Allergie nicht weiter verwenden.
- Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic ist nicht zur Blutstillung von schwer blutenden Wunden empfohlen.
- Infizierte Wunden sollten nur unter der Aufsicht medizinischer Fachkräfte behandelt werden.

**Produktenorgung**  
Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Wegwerfkomponenten Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung des Verbands bei sensiblen Patientengruppen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem Wiedersprechen. Der Wundverband sollte bei diesen Patientengruppen daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen. Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinproduktes ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann Ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

Vor dem Öffnen die Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tunnel, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, abgeflachte, gerissene oder unvollständige Siegelung.

Das Produkt sollte bei einer Temperatur zwischen 5° und 40° C gelagert werden.

### Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.  
Weitere Informationen auf Anfrage.  
Stand der Information: 2023-03-28

DE – PAUL HARTMANN AG - Paul-Hartmann-Strasse 12 - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY  
AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2355 Wiener Neudorf  
CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen

## EN Instructions for use

### Product description

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic alginate is made of natural fibres derived from seaweed. It is designed to be a highly absorbent and strong saugability. The alginate absorbs wound exudates and forms a gel-like covering over the wound, maintaining a moist wound healing environment which accelerates the healing process and helps to stop bleeding. The gel-like surface also keeps the dressing from adhering to the wound, so it is painless to remove.

### Composition

- calcium alginate
- sodium alginate

### Intended purpose and indications

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is indicated for the management of moderate to heavily exuding partial to full thickness wounds, including:

- surface trauma
- cavity wounds
- pressure ulcers
- diabetic foot ulcers
- venous/arterial leg ulcers
- donor sites
- post-operative wounds

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is intended to be used by lay persons and health care professionals.

### Mode of application

1. Clean the wound with saline solution and dry the surrounding skin of the wound gently.
2. Choose the right size of the dressing according to the dressing to the dressing to the wound bed correctly ab.
3. Choose the right size of the dressing according to the dressing to the dressing to the wound bed correctly ab.
4. Choose the right size of the dressing according to the dressing to the dressing to the wound bed correctly ab.
5. Choose the right size of the dressing according to the dressing to the dressing to the wound bed correctly ab.

### Removal:

1. Gently remove the secondary dressing.
2. If the wound appears dry, saturate the dressing with saline solution prior to removal.
3. Gently remove the dressing from the wound bed and discard.

### Contraindications

- Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is contraindicated on any patients who may be allergic to any of its ingredients.
- Do not use this product on dry wounds.
- The dressing is not indicated for surgical implantation.

### Precautions

- If redness or allergic symptoms appear, please stop using the product.
- Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is not recommended to control heavy bleeding wounds.
- Infected wounds should only be treated under the supervision of a healthcare professional.

### Product disposal

In order to minimize the risk of potential infection hazards or environmental pollution, disposable components of Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.

### Special precautions

In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups, this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.

### Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is meant for single use only.

Resealing, Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance.

### Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage.

Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

### Incident reporting

For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices); if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Information available on request.

Date of revision of the text: 2023-03-28

## NL Gebruiksaanwijzing

### Productbeschrijving

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic alginaat is vervaardigd uit natuurlijke vezels afkomstig uit zeewier. Het is een steriel, niet-voorn verbonden, ontwikkeld voor zeer sterke, snelle absorptie. Het alginaat absorbeert wondexsudaat en vormt een gelachtige afdekking over de wond. Dit houdt de omgeving voor de wondgezondte en helpt, wat het genezingsproces versnelt en helpt om de bloeding te stoppen. Het gelachtige oppervlak voorkomt ook dat het verband aan de wond blijft vastzitten, zodat het verwijderen van het verband geen pijn doet.

### Samenstelling

- calciumalginaat
- natriumalginaat

### Beoogd gebruik en indicaties

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is geïndiceerd voor het beheer van matige tot sterk exsuderende wonden van gedeeltelijke tot volledige diepte, waaronder:

- oppervlaktetrauma
- diepe wonden

### Compositie

- alginate de calcium
- alginate de sodium

### Utilisation prévue et indications

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic est indiqué pour le traitement des plaies avec une quantité d'exsudats modérée à élevée, d'épaisseur partielle à totale, notamment:

- traumatisme en surface
- plaies cavitaires
- escarre
- ulcères du pied diabétique
- ulcères veineux/ artériels de la jambe
- sites donateurs de greffe
- plaies post-opératoires

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic est destiné à être utilisé par toute personne, professionnelle de santé ou non.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic peut rester sur la plaie plaie jusqu'à sept jours. Veuillez noter que la fréquence du renouvellement de pansement dépend de l'état de la plaie et du niveau d'exudats.

### Compositie

- drukulus
- diabetische voetulcus
- veneuze/arteriële beenulcera
- donorplaatsen
- postoperatieve wonden

### Utilisation prévue et indications

Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic is bedoeld voor gebruik door leken en professionele zorgverleners.

### Wijze van aanbrengen

1. Maak de wond schoon met behulp van een zoutoplossing en maak de omringende huid op de wond voorzichtig droog.
2. Kies de juiste maat van het verband voor het wondoppervlak. Breng het verband aan op het wondbed zonder het omliggende huidoppervlak te overlappen ter voorkoming van verrekking van de huid.
3. Gebruik voor diepe wonden Sorbalgon T Classic.
4. Bedek en fixeer het alginateverband met een secundair verband.
5. Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic kan tot zeven dagen op de wond blijven. Let erop dat de frequentie waarmee het verband wordt gewisseld, afhankelijk is van de conditie van de wond en de hoeveelheid exsudaat.

### Mode d'application

1. Nettoyer la plaie à l'aide d'une solution physiologique et sécher délicatement la peau environnante.
2. Choisir un pansement de la taille appropriée, en fonction de la taille de la plaie. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie sans recouvrir la peau environnante pour éviter toute macération.
3. Pour les plaies cavitaires, veuillez utiliser Sorbalgon T Classic.
4. Recouvrir et fixer Sorbalgon Classic/Sorbalgon T Classic à l'aide d'un pansement secondaire.
5. Sorbalgon Classic/Sorbal

